

Листовка: информация за пациента

**Лакс 7,5 mg/ml перорални капки, разтвор
Натриев пикосулфат**

**Laxx 7,5 mg/ml oral drops, solution
Sodium picosulfate**

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 4-5 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Лакс и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Лакс
3. Как да използвате Лакс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Лакс
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Лакс и за какво се използва

Натриевият пикосулфат е активното вещество, съдържащо се в лекарствения продукт Лакс. Оказва слабителен ефект в резултат на непосредствено действие върху лигавицата на дебелото черво. Стимулира неговите движения (перисталтика), предизвиква натрупване на течности и соли в кухината му. По този начин води до омекотяване на изпражненията и улеснява изпразването на червата.

Лакс се прилага за краткосрочно лечение на запек при възрастни и деца, както и при необходимост от улесняване на изхождането, напр. преди някои изследвания на червата.

Ако след 4-5 дни след започване на приема на това лекарство не се почувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Лакс

Не използвайте Лакс ако:

- сте алергични към натриев пикосулфат или някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
- имате запушване, преплитане или възпаление на червата, апендицит;

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	22200 162
Разрешение №	86/МА/176-50687
Одобрение №	09-06-2020



- имате силна коремна болка, придружена с гадене и повръщане, температура (това може да бъде признак на по-сериозно състояние);
- установили сте наличие на кръв в изпражненията;
- имате значимо обезводняване.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате Лакс.

Необходимо е да знаете, че:

- ежедневното и продължително приложение на това лекарство е нежелателно; Причините за Вашия запек трябва да бъдат изяснени внимателно, особено ако оплакванията продължават и не е налице подобряване на състоянието след прием на лекарството.
- продължителното приложение на високи дози може да доведе до нарушаване на водно-солевото равновесие в организма и до намаляване на кръвните нива на калия.
- трябва да се обърнете към лекар, ако имате засилено чувство на жажда или намалено отделяне на урина, които могат да бъдат симптоми на обезводняване. Тези признания, изискват особено внимание при деца, лица в напреднала възраст или такива с бъбречни заболявания;
- в някои случаи е възможно да се появи замаяност или прилошаване, които обикновено се дължат на запека и свързаните с него коремна болка и затруднено изхождане;
- при деца лекарството се прилага само по лекарско предписание.

Други лекарства и Лакс

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Приложението на високи дози натриев пикосулфат едновременно с диуретици (обезводняващи лекарства, които усилват отделянето на урина) или кортикоステроиди (лекарства за лечение на алергични, ревматични, автоимунни и други заболявания) може да повиши риска от нарушения в солевия баланс на организма.

Тези нарушения от своя страна могат да повишат чувствителността към действието на сърдечните гликозиди (лекарства за лечение на сърдечна недостатъчност и нарушения на сърдечния ритъм, например дигоксин).

Антибиотиците могат да намалят действието на лекарството при едновременно приложение.

Лакс с храни, напитки и алкохол

За облекчаване на запека е препоръчително ежедневно да се консумира храна богата на фибри, плодове и зеленчуци, които стимулират изпразването на червата и да се приема достатъчно количество вода.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятайте, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Не се препоръчва приложението на Лакс при бременни, поради липса на достатъчно данни за неговото безопасно използване. Решение за приложението му по време на бременността трябва да бъде взето единствено от лекар, който ще прецени възможния риск за майката и бебето.



Това лекарство може да се използва по време на кърмене, тъй като няма данни за излъчването на натриев пикосулфат в майчината кърма.

Шофиране и работа с машини

Лакс обичайно не повлиява способността за шофиране или работа с машини.

Необходимо е да знаете, че поради възможността от възникване на замаяност или прилошаване, свързани с болката и нарушеното изхождане, трябва да избягвате потенциално опасни действия като шофиране и работа с машини при поява на такива оплаквания.

Лакс съдържа сорбитол

Това лекарство съдържа като подсладител сорбитол (1 g сорбитол отговаря приблизително на 17 kJ/4 kcal). Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да приемате този продукт.

3. Как да използвате Лакс

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

Възрастни, лица в напредната възраст и деца над 10 години

14 – 27 капки еднократно дневно. Започнете с 14 капки, като дозата може да бъде увеличена до 27 капки. Максималната доза от 27 капки не трябва да бъде превишавана.

Деца между 4 и 10 години

7 – 14 капки еднократно дневно. Започнете с 7 капки, като дозата може да бъде увеличена до 14 капки. Максималната доза от 14 капки не трябва да бъде превишавана.

Деца под 4 години

1 капка на 2 kg телесно тегло.

При деца натриев пикосулфат може да бъде прилаган единствено след назначение от лекар.

Начин на приложение

Това лекарство е препоръчително да се приема еднократно вечер в часовете преди сън с оглед предизвикване на изхождане на следващата сутрин. Ефектът му настъпва между 6 и 12 часа след приема.

Капките могат да бъдат поставени в чаша с вода за да се улесни приема.

Ежедневната употреба на продукта е нежелателна. Ако след прием на лекарството в продължение на 4 - 5 дни не се почувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, е необходимо да се обрънете към Вашия лекар.

Ако сте приели по-голяма от необходимата доза Лакс

Ако приемете натриев пикосулфат в дози, значително по-високи от обичайните, може да се появят диария, коремни болки и спазми, понижение на нивата на калия в кръвта, обезводняване.

Продължителното приемане на високи дози може да предизвика хронична диария, коремни болки, понижение на нивата на калия в кръвта, повищена функция на надбъбречните жлези, образуване на камъни в бъбреците. Има описани случаи на увреждане на бъбреците и мускулна слабост, вследствие на намалените калиеви нива в кръвта.



При поява на симптоми на предозиране прекратете употребата на лекарството и незабавно се обърнете към лекар.

Ако сте пропуснали да приемете Лакс

Ако сте пропуснали да приложите една доза, направете това колкото е възможно по-скоро след като сте си спомнили. Не прилагайте двойна доза, за да компенсирате забравената. Приложете следващата доза в обичайното време.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

При лечение с това лекарство е възможна появата на следните нежелани реакции:

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

- диария

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):

- коремни спазми
- коремна болка
- коремно неразположение

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

- гадене
- повръщане
- замайване

С неизвестна честота (честотата не може да бъде определена от наличните данни):

- прилошаване
- кожни обриви
- тежка алергична реакция, която причинява подуване на лицето или гърлото.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +359 28903417

Уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Лакс

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25 °C.



Не използвайте Лакс след срока на годност (годен до ...), отбелаян върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. След първото отваряне на опаковката, лекарството може да бъде употребявано до 12 месеца.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Лакс

- Активното вещество в 1 ml разтвор (20 капки) е натриев пикосулфат 7.5 mg.
- Другите съставки са сорбитол, натриев бензоат, натриев цитрат, лимонена киселина монохидрат, пречистена вода

Как изглежда Лакс и какво съдържа опаковката

Бистър, безцветен разтвор.

Лакс се предлага в бутилка от тъмно стъкло, съдържаща 20 ml разтвор и затворена с пластмасова капачка с вграден капкомер.

Притежател на разрешението за употреба

ДАНСОН-БГ ООД

ул. Отец Паисий № 26

2400 гр. Радомир

България

Производител

ВЕТПРОМ АД

ул. Отец Паисий № 26

2400 гр. Радомир

България

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

ДАНСОН-БГ ООД

ул. Отец Паисий № 26

2400 гр. Радомир

България

Дата на последно преразглеждане на листовката 05/2020.

