

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Duspatalin 135mg coated tablets
Дуспаталин 135 mg обвити таблетки

Мебеверин хидрохлорид (mebeverine hydrochloride)

ИСПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА	
Листовка - Приложение 2	
Одобрение №	20371 / 27.11.2012
Одобрение №	/

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Дуспаталин и за какво се използва
2. Преди да приложите Дуспаталин
3. Как се прилага Дуспаталин
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Дуспаталин
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДУСПАТАЛИН И ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА?

Дуспаталин съдържа лекарство, наречено мебеверин. То спада към групата на т. нар. антиспазмолитици, които действат върху червата.

Червата представляват дълга мускулна тръба, по която храната минава и се преработва. Когато настъпи спазъм в червата, те се стесняват и това води до болка. Това лекарство памага за облекчаване на болката и спазъма.

Дуспаталин се прилага за облекчаване на симптомите на т. Нар. Синдром на раздразненото черво. Тези симптоми могат да варират, но могат да включват:

- Стомашни болки и спазми;
- Чувство на подуване и образуване на газове;
- Диария, запек или комбинация от двете;
- Малки, твърди изпражнения с форма на топчета или ленти.

Потърсете Вашия лекар ако симптомите Ви се влошават или не се подобряват след 2 седмици лечение.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ ДУСПАТАЛИН

Вие не трябва да приемате този лекарствен продукт ако:

- Сте алергични към мебеверин или към някое от другите съставки на Дуспаталин.

Ако не сте сигурни в нещо, моля, попитайте Вашия лекар!



Обърнете специално внимание при употребата на Дуспаталин

Попитайте Вашия лекар преди да вземете лекарството ако:

- Това е първият път, когато получавате тези симптоми;
- Имате кръв в изпражненията;
- Ако Ви се повръща или повръщате;
- Ако сте блед и се чувствате уморен;
- Ако имате тежък запек;
- Ако имате повишена температура;
- Ако скоро сте пътували в чужбина;
- Ако имате трудности или болка при уриниране;
- Ако имате необичайно кървене или течение от влагалището;
- Ако сте бременна и кърмите.

Ако нещо от горепосоченото се отнася за Вас, говорете с Вашия лекар преди да примете Дуспаталин!

Прием на други лекарства

Не се очаква Дуспаталин да повлияе някое от другите лекарства, които приемате. Въпреки това, съобщете на лекаря ако взимате или сте взимали наскоро някакви лекарства. Това включва лекарства без рецепта и билкови продукти.

Обвити таблетки със захарно покритие за перорално приложение, съдържащи 135 mg мебеверинов хидрохлорид.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, попитайте лекаря за съвет преди да вземате лекарства!

- Кажете на лекаря ако сте бременна или може да сте бременна. Дуспаталин не се препоръчва по време на бременност. Вашият лекар може да Ви посъветва да спрете приема на Дуспаталин или да го замените с друго лекарство.
- Кажете на лекаря ако кърмите или започване да кърмите. Дуспаталин не се препоръчва по време на кърмене. Вашият лекар може да Ви посъветва да спрете кърменето или да вземате друго лекарство ако искате на кърмите.

Шофиране и работа с машини

Малко вероятно е това лекарство да засегне способността за шофиране или работа с машини.

Важна информация за някои от помощните вещества на Дуспаталин

Дуспаталин съдържа лактоза и сукроза (видове захари). Ако не можете да понасяте или преработвате някои захари, съобщете на Вашия лекар!

3. КАК СЕ ПРИЛАГА ДУСПАТАЛИН

Винаги приемайте Дуспаталин точно както е описано по-долу. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дуспаталин може да се приема от възрастни и деца над 10 годишна възраст.

Гълтайте таблетките цели с пълна чаша вода. Не ги чупете или дъвчете.

Опитайте се да ги приемате по едно и също време всеки ден. Това ще Ви помогне да не забравите да ги приемате.



Обичайната доза е една таблетка 3 пъти дневно. Не взимайте повече.
Таблетките действат най-добре ако ги вземате 20 минути преди хранене и разпределите приема им равномерно през деня.
Не давайте Дуспаталин на деца под 10-годишна възраст.

Ако сте приели повече от необходимата доза Дуспаталин

Ако сте взели повече от лекарството, трябва да кажете на лекаря си или да отидете веднага до лечебно заведение. Вземете опаковката и тази листовка със себе си.

Ако сте забравили да вземете Дуспаталин

Ако сте пропуснали да приемете дозата си, вземете следващата в обичайното време.
Не взимайте двойна доза, за да наваксате пропуснатата.

Ако имате допълнителни въпроси за приложението на това лекарство, попитайте лекаря си!

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, така и този лекарствен продукт може да доведе до появата на нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Следните нежелани реакции могат да се наблюдават при това лекарство:

Спрете приема на Дуспаталин и отидете при лекаря си веднага, ако забележите някоя от следните сериозни нежелани реакции – може да се нуждаете от спешно лечение:

- Трудности при дишане, подуване на лицето, врата, устните, езика или гърлото.
Може да имате тежка алергична реакция към лекарството.

Ако получите посочените по-горе ефекти, спрете Дуспаталин и веднага се срещнете с лекар!

Други нежелани ефекти включват:

- Може да получите по-леки алергични реакции – кожен обрив, зачервена и сърбяща кожа.

Ако някой от тези ефекти стане сериозен или забележите реакция, която не е описана в тази листовка, моля съобщете на Вашия лекар.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ДУСПАТАЛИН

- Съхранявайте на място, недостъпно за деца
- Не съхранявайте при температура над 30 °C. Съхранявайте в оригиналната опаковка!
- Не използвайте Дуспаталин след срока на годност отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
- Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте лекаря как да унищожите лекарство, което не Ви трябва. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Дуспаталин

Активното вещество е мебеверин хидрохлорид. Всяка таблетка съдържа 135 mg.

Другите съставки са: лактоза монохидрат, картофено нишесте, повидон, талк, магнезиев стеарат, сукроза, желатин, акация, карнаубски восък



Как изглежда Дуспаталин и какво съдържа опаковката

Бели, кръгли обвити таблетки по 15 броя в блистери от PVC-Al или PVC/PVDC-Al; по 2 блистера в кутия

Бели, кръгли обвити таблетки по 10 броя в блистери от PVC-Al или PVC/PVDC-Al; по 2 блистера в кутия

Не всички опаковки се намират на пазара.

Притежател на разрешението за употреба

Abbott Healthcare Products B.V.,

C.J. van Houtenlaan 36,

1381 Weesp,

Нидерландия

Производители

Abbott Healthcare SAS

Route de Belleville,

Lieu dit Maillard,

01400 Châtillon sur Chalaronne,

Франция

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

България

Абот Продъктс ЕООД

Бул. Ситняково № 48 ет.7

1505 София

Тел. +359 2 44 55 400

Дата на последно актуализиране на листовката

Ноември 2012

