

**Информация за пациента.****Моля, прочетете внимателно!****ХЕПАРОИД ЗЕНТИВА 100 IU/mg маз  
HEPAROID ZENTIVA 100 IU/mg ointment**

Хепариноид/Heparinoid

**Прочетете внимателно тази листовка преди да започнете да използвате този лекарствен продукт**

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**В тази листовка:**

1. Какво е ХЕПАРОИД ЗЕНТИВА и за какво се използва
2. Преди да започнете да използвате ХЕПАРОИД ЗЕНТИВА
3. Как да използвате ХЕПАРОИД ЗЕНТИВА
4. Възможни нежелани реакции
5. Как се съхранява ХЕПАРОИД ЗЕНТИВА
6. Допълнителна информация

<b>ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА</b>	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. № 20000241	
Разрешение № 11-11532 /0. 12. 2010	
Одобрение № 9, 08.12.2010	

**1. КАКВО Е ХЕПАРОИД ЗЕНТИВА И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА**

Дermatologично, антитромботично и противовъзпалително средство (за лечение на възпаления и посттравматични състояния).

Хепароид Зентива ограничава съсирането на кръвта в мястото на възпаление или контузия при травми. Възпрепятства образуването на кръвни съсиреци, ускорява разсеяването на кръвоизливи, намалява появата на отоци и има противовъзпалително действие. След като отоците и кръвоизливите отминат, усещането на напрегнатост и болка в мястото на възпаление или нараняване намалява.

Хепароид Зентива е предназначен за употреба както от възрастни, така и от деца от най-ранна възраст за лечение на тендинит, посттравматични отоци, контузии и навяхвания, за подпомагане заздравяването на белези след наранявания или операции и омекотяване на твърди и подути белези; също така може да се използва, когато е препоръкан от лекар, за локално лечение на възпаления на повърхностни вени, възпаление около вени за омекотяване на твърда кожа при венозна недостатъчност. По време на бременност и кърмене може да се прилага само след разрешение от лекар.



## **2. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ХЕПАРИОД ЗЕНТИВА**

- свръхчувствителност към някоя от съставките му
- ако имате проблеми с кръвосъсирването, не употребявайте лекарствения продукт за намазване на големи по площ участъци. Лекарственият продукт не трябва да се нанася върху отворени рани, лигавици и в очите.

### **Бъдете особено внимателни с Хепароид Зентива:**

При заболяване на вените се консултирайте с Вашия лекар относно продължителността на употреба на Хепароид Зентива. Ако лекарят не реши друго, при тези заболявания той се прилага обикновено в продължение на 1 - 2 седмици. Приложението на Хепароид Зентива е само част от комплексната терапия за лечение на заболявания на вените. Спазвайте останалите препоръчани от лекаря процедури (употреба на други лекарствени продукти, компресивна превръзка с бинт или чорап).

Ако при наранявания до 3 дни не се забележи подобрене или признаците се влошат, или се появят странични ефекти, преустановете употребата му и се обърнете за помощ към лекар. Без консултация с лекар не употребявайте лекарствения продукт повече от 2 седмици.

Хепароид Зентива не трябва да се нанася върху отворени рани, лигавици и в очите.

Ако по случайност малко дете погълне по-голямо количество от лекарствения продукт, това може да доведе до гадене и повръщане. В този случай предизвикайте повръщане или го улеснете и потърсете лекарска помощ.

### **Прием на други лекарства**

Хепароид Зентива не може да се използва едновременно с някои други лекарствени продукти за локално приложение, например с продукти, съдържащи тетрациклин, хидрокортизон или салицилова киселина. Ако употребявате други лекарствени продукти, било то с рецептата от лекар или без нея, посъветвайте се с лекуващия лекар дали Хепароид Зентива е подходящ за Вас. Едновременно с него не използвайте и други свободно продавани лекарствени продукти за локално приложение. Когато лекар Ви изписва други лекарствени продукти, предупредете го, че употребявате Хепароид Зентива.

### **Бременност и кърмене**

През последното тримесечие на бременността лекарственият продукт не трябва да се използва продължително време или с него да се намазват големи участъци по кожата, защото може да предизвика кръвоизлив. При кърмене мазта може да се използва за кратко и само за малки по площ участъци от кожата.

По време на бременност и кърмене лекарственият продукт може да се употребява само със съгласието на лекуващия лекар.

### **Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини**

Не повлиява дейности, изискващи повишено внимание.



### **3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ХЕПАРОИД ЗЕНТИВА**

Ако лекарят не предпише друго, възрастни, юноши и деца намазват засегнатото място и областта около него 2 - 3 пъти дневно с приблизително 1 мм дебел слой маз, който се втрива леко в кожата. При заболяване на вените може да се приложи компресивна превръзка. При големи и болезнени кръвоизливи, лекуваното с мазта място, може в началото да се покрие с непропускаща въздух превръзка, най-добре през нощта. При варикозна язва мазта трябва да се вtrie в кожата около нея.

*Ако имате допълнителни въпроси за употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.*

### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

*Както всички лекарства, Хепариод Зентива може да предизвика нежелани лекарствени реакции, въпреки че не всеки страда от тях*

При употреба на лекарствения продукт могат да се появят временни зачервявания на кожата или сърбеж. Ако забележите тези или други нежелани реакции, консултирайте се с Вашия лекар.

В редки случаи по време на лечението може да се наблюдава свръхчувствителност към някоя от съставките на лекарствения продукт, изразяваща се с локално подуване и зачервяване на кожата, с усещане за парене и сърбеж, понякога с обриви от малки пъпчици. В такъв случай прекъснете лечението и се консултирайте с Вашия лекар относно по-нататъшното използване на лекарствения продукт.

*Ако някоя от нежеланите реакции се задълбочи или ако забележите нежелана реакция, неупомената в тази листовка, моля, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.*

### **4. КАК СЕ СЪХРАНЯВА ХЕПАРОИД ЗЕНТИВА**

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25 °C. Да се пази от влага.

Да не се използва Хепариод Зентива след изтичане срока на годност, посочен върху опаковката. Срокът на годност изтича в последния ден на отбелязания месец.

Не използвайте Хепариод Зентива, ако забележите видими признания на влошаване.

*Лекарствата не бива да се изхвърлят в отходните води или в битовата смет. Попитайте Вашия лекар или фармацевт как да се освободите от лекарство, което вече не Ви е нужно. Тези мерки ще подпомогнат опазването на околната среда.*



## **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

### **Какво съдържа Хепариод Зентива**

- Активното вещество е хепариноид (100 IU/mg) 60 mg в 30 g маз.
- Помощни вещества: парафин твърд, парафин течен, цетил-стеарил алкохол, стеаринова киселина, пчелен восък бял, моноглицериди на наситени висши мастни киселини, етоксилирани C<sub>12</sub>-C<sub>14</sub> алкохоли, пропиленгликол, троламин, метилпрахидрокси-бензоат, пропилпрахидрокси-бензоат, пречистена вода, ароматна композиция.

### **Какво представлява Хепароид Зентива и съдържание на опаковката**

Една туба с 30 g маз и листовка за пациента в кутия.

### **Притежател на Разрешението за употреба**

Zentiva k. s.,  
U Kabelovny 130  
102 37 Prague 10  
Чешка Република

### **Дата на последна редакция на листовката**

Декември 2010

