

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Нурофен Форте 400mg обвити таблетки
Ибупрофен

Nurofen® Forte 400mg coated tablets
Ibuprofen

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.

Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 10 дни.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Нурофен Форте и за какво се използва
2. Преди да използвате Нурофен Форте
3. Как да използвате Нурофен Форте
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Нурофен Форте
6. Допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	9800354
Разрешение №	17/33 / 14.03.2012
Одобрение №	

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НУРОФЕН ФОРТЕ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Нурофен Форте съдържа 400mg ибупрофен, който принадлежи към групата на нестероидните противовъзпалителни лекарствени продукти (НСПВС).

НСПВС осигуряват облекчение като променят отговора на организма към болка и възпаление.

Нурофен Форте е предназначен за симптоматично облекчаване на слаба до средно силна болка като: мигренозно главоболие, болка в гърба, зъбобол, невралгия, менструални болки, ревматични и мускулни болки.

Нурофен облекчава болката, намалява възпалението и температурата.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕТЕ НУРОФЕН ФОРТЕ

Не използвайте Нурофен Форте

- ако сте алергични (свърхчувствителни) към ибупрофен, ацетилсалицилова киселина или към някоя от останалите съставки на Нурофен Форте.
- имате или сте имали някога язва на стомаха или дванадесетопръстника
- ако сте имали стомашно-чревно кървене или перфорация, свързано с предишно лечение с НСПВС
- ако имате остра чернодробна, бъбречна или сърдечна недостатъчност
- ако имате астма, бронхоспазм, алергични обриви или сърбежи, появява се алергична хрема, когато взимате ибупрофен, ацетилсалицилова киселина или подобни на тях лекарствени продукти



- вашата възраст е под 12 години
- ако сте през последния триместър на бременността

Обърнете специално внимание при употребата на Нурофен Форте

- имате астма или сте получавали астматични пристъпи
- имате бъбречни, сърдечни или чернодробни проблеми
- имате системен лупус еритематозус или друго смесено съединително-тъканно заболяване
- бременни сте или кърмите

Предупреждения

Лекарства като Нурофен Форте могат да бъдат свързани с леко увеличен риск от сърдечен инцидент („миокарден инфаркт“) или инсулт. Всеки риск е по-вероятен при високи дози и при продължително лечение. Не превишавайте препоръчаните дози и продължителността на лечението от 4 дни.

Ако имате проблеми със сърцето, прекаран инсулт или мислите, че за Вас може да има риск от появата им (например ако имате високо кръвно налягане, диабет, повишени стойности на холестерол или сте пушач) трябва да обсъдите лечението с Вашия лекар или фармацевт.

Прием и употреба на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Ибупрофен (както другите НСПВС) не трябва да се използва в комбинация с:

- Ацетилсалицилова киселина, освен ако ниска доза ацетилсалицилова киселина (под 75 mg дневно) е била предписана от лекар, тъй като това може да повиши риска от нежелани реакции
- Други от групата на нестероидните противовъзпалителни лекарствени продукти
- Лекарствени продукти за високо кръвно налягане, включително и диуретици
- Лекарствени продукти за разреждане на кръвта (антикоагуланти)
- Кортикостероиди
- Метотрексат или лекарствени продукти, съдържащи литий
- Зидовудин

Бременност и кърмене

Има данни за единични случаи на употреба на нестероидните противовъзпалителни лекарствени продукти прилагани, продължително и при по-високи дози, които могат да повлияят временно и обратимо възможността за забременяване.

Употребата на Нурофен по време на бременност трябва, ако е възможно да бъде избягвана през първите 6 месеца от бременността.

По време на третия триместър, приема на ибупрофен е противопоказан,

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ НУРОФЕН ФОРТЕ

Винаги приемайте Нурофен Форте точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

За възрастни и деца над 12 години:

Първоначално се приема 1 таблетка с вода, след това ако е необходимо се взема 1 таблетка на всеки 4 часа, но не повече от 3 таблетки за 24 часа.

Не прилагайте на деца под 12 години без лекарско предписание.



За пациенти в старческа възраст: Не се изисква промяна на дозата.

Минималната ефективна доза трябва да се използва за кратък период от време, необходимо за облекчаване на симптомите. Ако се наложи да приемате продукта повече от 4 дни или симптомите се запазват или се влошават, консултирайте се с лекар.

Оставете поне четири часов интервал между дозите и не приемайте повече от 1200 mg за 24 часа.

Ако сте приели повече от необходимата доза Нурофен Форте

Ако сгрешите и приемете повече таблетки от посочената доза, незабавно се свържете с лекар.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства Нурофен Форте може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нурофен Форте таблетки има добра поносимост и се приема много добре от повечето хора. В отделни случаи могат да се появят следните нежелани лекарствени реакции: стомашни смущения, болка, гадене, стомашна язва, оцветени в черно изпражнения, влошаване на астматични пристъпи, затруднено дишане, бъбречни или чернодробни проблеми, главоболие, замайване и смущения в слуха, много рядко кожни обриви, сърбежи, лющене на кожата, склонност към лесно получаване на синини.

Лекарства като Нурофен Форте могат да бъдат свързани с леко повишен риск от сърдечен инцидент („миокарден инфаркт“) или инсулт.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ НУРОФЕН ФОРТЕ

Да се съхранява под 25° C.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Нурофен Форте след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Нурофен Форте

- Активното вещество е: ибупрофен 400mg
- Другите съставки са: кроскармелоза натрий, натриев лаурил сулфат, натриев цитрат, стеаринова киселина, колонадален безводен силиций, кармелоза натрий, талк, гума арабика, захароза, титанов диоксид, пречистена вода, макрогол 6000 и червено мастило Опакод S-1-15094.

Как изглежда Нурофен Форте и какво съдържа опаковката

Опаковка Нурофен Форте съдържа 10, 12, 20, 24 таблетки.

На Българския пазар се маркетират 12 обвити таблетки.



Притежател на разрешението за употреба:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH
Великобритания

Производител:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Nottingham Site, Thane Road, Nottingham, NG90 2DB
Великобритания

Дата на последно одобрение на листовката: Януари, 2012

