

Листовка: информация за потребителя

Репарил - гел Н, гел
1g есцин, 5g диетиламин салицилат
Reparil®- Gel N, gel
1g Aescin, 5g diethylamine salicylate

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашият фармацевт. Ако получите някакви нежелани, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовката:

1. Какво представлява Репарил - гел Н и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Репарил - гел Н
3. Как да използвате Репарил - гел Н
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Репарил гел Н
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рев. №	9700249
Разрешение №	86/ИА/МР-52290
Одобрение № / 09. 02. 2021	

1. Какво представлява Репарил - гел Н и за какво се използва

Репарил гел Н намалява отоците, спира възпалението и премахва болката

Показания:

Травми с контузии, навяхвания, натъртвания, хематоми (кръвонасядания), възпаления на сухожилията.

Болкови синдроми на гръбначния стълб (прешлените, врата, лумбаго, ишиас).

Повърхностни флебити, разширени вени.

След венозни инжекции или инфузии.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Репарил - гел Н

Не използвайте Репарил гел Н

- ако сте алергични към активните вещества или към някоя от помощните вещества на това лекарство (изброени в точка 6).
- Репарил - гел Н не трябва да се прилага върху открити рани, лигавици или кожни участъци, подложени на радиотерапия (обльчване).

Предупреждения и предпазни мерки

Трябва да се избягва контактът с очите. Говорете с Вашия лекар, или фармацевт, преди да използвате Репарил гел Н.

Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба

Този лекарствен продукт е предначен само за външна употреба.



Пациентите, свръхчувствителни към салицилати, са изложени на по-голям риск от развиващи се астматични пристъпи, локално подуване на кожата и лигавицата (оток на Квинке) или уртикария, отколкото други пациенти. При тези пациенти Репарил-Гел Н трябва да се използва внимателно и само под пряк медицински контрол.

Трябва да се избягва контактът с очите.

Този лекарствен продукт съдържа като аромати масло от лавандула и масло от горчив портокал с дилимон, фарнезол и линалоол. Тези вещества могат да причинят алергични реакции.

Други лекарства и Репарил - гел Н

Не са съобщени взаимодействия между Репарил-Гел Н, използван съгласно инструкциите за употреба, и други лекарствени продукти. Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт ако вземате или сте вземали наскоро някакви други лекарства, даже и такива, които са без рецептa.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

По време на бременност и кърмене продължителна употреба върху обширни участъци от кожата трябва да се избягва. При кърмене продуктът не трябва да се прилага в областта на гърдите.

Шофиране и работа с машини

Не се изискват специални мерки

Репарил гел съдържа масло от лавандула и горчив портокал

Това лекарство съдържа аромат с алергени. Алергените (в лавандуловото масло: d-лимонен (D-Limonen) и линалоол (Linalool) и в маслото от горчив портокал: d-лимонен (D-Limonen), фарнесол (Farnesol), линалоол (Linalool)) може да причинят алергични реакции.

3. Как да използвате Репарил - гел Н

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е между 15 - 20 g гел на ден.

Ако не е предписано друго от Вашия лекар, прилагайте Репарил – гел Н от един до три пъти дневно.

Начин на употреба:

Намазва се слой от гела върху болния участък. Не е нужно да се втрива, но при желание се допуска.

Репарил-Гел Н трябва да се остави да изсъхне върху кожата за няколко минути преди да се облечете. Не се препоръчва използването на тесни дрехи.

Ако имате допълнителни въпроси за употребата на този продукт, говорете с Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Използват се следните данни за определяне честотата на тези реакции:



Много чести	повече от 1 на 10 от третираните пациенти
Чести	1 до 10 от 100 третирани пациенти
Нечести	1 до 10 от 1,000 третирани пациенти
Редки	1 до 10 от 10,000 третирани пациенти
Много редки	По-малко от 1 от 10,000 третирани пациенти
Няма известни	Честотата не може да бъде преценена от наличните данни

Този лекарствен продукт е предназначен само за външна употреба.

В много редки случаи могат да настъпят алергични кожни реакции.

Пациентите, свръхчувствителни към салицилати, са изложени на по-голям риск от развиващи се астматични пристъпи, локално подуване на кожата и лигавицата (оток на Квинке) или уртикария, отколкото други пациенти. При тези пациенти Репарил-Гел Н трябва да се използва внимателно и само под пряк медицински контрол.

Този лекарствен продукт съдържа като аромати масло от лавандула и масло от горчив портокал с дилимон, фарнезол и линалоол. Тези вещества могат да причинят алергични реакции.

Ако някоя от споменатите реакции стане сериозна или ако забележите някои неспоменати в тази листовка нежелани реакции, моля информирайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако имате допълнителни въпроси по отношение на употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев“ № 8
1303 София
Тел.: +359 2 8903417
Уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Репарил - гел Н

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху кутийката и тубата. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Условия на съхранение

Не се изискват специални условия на съхранение.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Репарил – гел Н:

Активните вещества са: есцин (aescin) и диетиламин салицилат (diethylamine salicylate). 100 g Репарил – гел Н, гел съдържат 1 g Есцин и 5 g Диетиламин салицилат



Другите съставки са: полиакрилова киселина, макрогол-6-глицерол каприлокапрат, натриев едетат, трометамол, трис 2-пропанол и ароматизатори - масло от лавандула и масло от нероли (масло от цвет на горчив портокал)

Как изглежда Репарил – гел Н и какво съдържа опаковката

Репарил – гел Н е прозрачен, безцветен до жълтеникав
Оригиналните опаковки са по 40 g и 100 g
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара

Притежател на разрешението за употреба:

Майлан ЕООД
Офис сграда „Сердика офиси“
бул. Ситняково № 48, ет. 7
1505 София
България

Производител на лекарствения продукт:

Madaus GmbH
51101 Cologne
Германия

Дата на последно преразглеждане на листовката: 11/2020
Рег. № 9700249

Свойства

Репарил -гел Н е специално разработен продукт на алкохолна основа, който въздейства в три направления: намалява отоците, възпрепятства възпаленията и намалява болката. Предлаган във форма, която осигурява проникването на есцина в кожата, където възпрепятства събирането на течности в тъканите и появата на отоци. Локалните отоци, предизвикващи често чувство за тежест и болезнено напрежение, бързо се отстраняват. Възпалителните процеси ефективно се овладяват.

Диетиламиносалицилатът усилива противовъзпалителния ефект и има изразено болкоуспокояващо действие в дълбочина.

Репарил - гел Н притежава следните допълнителни преимущества:

- Репарил - гел Н е прозрачен и прониква бързо и напълно в болните участъци;
- Репарил - гел Н не омазнява, не зацепва и поради това е изключително чист и приятен за употреба;
- Репарил - гел Н охлажда болезнения участък, успокоява и предпазва кожата и се понася забележително добре дори и от чувствителна кожа.

