

**ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА**

Листовка - Приложение 2

Към Рев. № ... 26700460

Разрешение № 11-16557, 26. 01. 2012

Уебсайт № ..... / .....

**Листовка: Информация за потребителя**

Engystol, tablets

Енгистол, таблетки

Хомеопатичен лекарствен продукт

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добрите резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

**В тази листовка:**

1. Какво представлява Енгистол и за какво се използва
2. Преди да приемете Енгистол
3. Как да приемете Енгистол
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Енгистол
6. Допълнителна информация

**1. Какво представлява Енгистол и за какво се използва**

Хомеопатичен лекарствен продукт.

Да активира неспецифичните защитни механизми, особено в случаите на грип и вирусни заболявания

**2. Преди да приемете Енгистол**

- Не приемайте Енгистол ако имате свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта. Този лекарствен продукт съдържа лактоза. Ако имате непоносимост към някои захари се консултирайте с лекар, преди приемането на този лекарствен продукт.
- Употреба на други лекарства – не са известни лекарствени взаимодействия
- Употреба на Енгистол с храни и напитки – няма несъвместимости
- Бременност и кърмене – посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
- Шофиране и работа с машини – Енгистол не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

**3. Как да приемете Енгистол**

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

При възрастни и деца над 6 год. възраст обикновено 3 пъти по 1 таблетка дневно.

Таблетките не се гълтат, а се държат в устата до разтварянето им.

Погълдането на таблетката не води до никакви вредни последствия!

- Употреба при деца – При кърмачета и деца до 3 год. възраст – по ½ таблетка до 3 пъти дневно. Таблетката се стрива и се нанася от вътрешната страна на бузата. От 3 до 6 год. възраст – по 1 таблетка до 3 пъти дневно.
- Ако сте приели повече от обичайната доза – Енгистол няма доза на предозиране
- Ако сте пропуснали да приемете Енгистол – Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.



- Ако сте спрели употребата на Енгистол – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар

#### **4. Възможни нежелани реакции**

При единични случаи, след приложението на Engystol, може да се появи кожен обрив и в такъв случай приложението на продукта да се спре и да се направи консултация с лекар.

#### **5. Как да съхранявате Енгистол**

Без специални условия на съхранение.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !

Срок на годност – 5 години.

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

#### **6. Допълнителна информация**

- Какво съдържа Енгистол

1 таблетка съдържа:

Активни вещества:

Vincetoxicum hirundinaria	D6	75 mg
Vincetoxicum hirundinaria	D10	75 mg
Vincetoxicum hirundinaria	D30	75 mg
Sulfur	D4	37,5 mg
Sulfur	D10	37,5 mg

Помощни вещества:

Магнезиев стеарат

- Как изглежда и какво съдържа опаковката: Пластмасов контейнер, съдържащ 50 таблетки/ картонена кутия

- Притежател на разрешението за употреба и производител:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D-76532 Baden-Baden, Германия

- Дата на последно одобрение на листовката:

07.2011

